

***Halálokok az 5 és 14 év közötti gyermekek körében
az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójában***

Lancet Child & Adolescent Health (2018; doi: 10.1016/S2352-4642(18)30095-6),

Published: 19 March 2018

Kulcsszavak: népegészségügy, halálozás, halálokok, gyermekegészségügy, balesetek, mérgeзések, Egészségügyi Világszervezet Európai Régiója

Forrás Internet-helye: [http://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642\(18\)30095-6/abstract](http://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30095-6/abstract) ; [http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanchi/PIIS2352-4642\(18\)30095-6.pdf](http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanchi/PIIS2352-4642(18)30095-6.pdf) ; [http://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642\(18\)30095-6/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30095-6/fulltext)

Hmwe Kyu és mt. (Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, Seattle) tanulmánya szerint az 5 és 14 év közötti gyermekek körében a leggyakoribb halálokok a balesetek és a sérülések. A halálozás az elmúlt 26 év során csökkent.

Az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójában 1990-ben a halálozások száma 54.000, 2016-ban 21.000 volt. A kutatók szerint a csökkenés elsősorban a Varsói Szerződés egykori államaiban (EU 13) és a volt Szovjetunió (CIS) országaiban az életkörülmények megváltozásának tulajdonítható.

Ennek ellenére ez utóbbi régióban a gyermekek túlélésének esélyei még mindig rosszabbak, mint Nyugat-Európában. A volt Szovjetunió országaiban négyszer annyi 5 és 14 év közötti gyermek hal meg közlekedési balesetekben, mint Nyugat-Európában, ám a különbség az 1990-es évek elején még nagyobb volt.

A gyermekkori halálozás második leggyakoribb oka a fulladás. A közép-ázsiai országokban, ahol a mezőgazdasági területek öntözésére nyitott rendszerekkel kerül sor, sok kút, gödör és medence van, a fulladás kockázata magasabb. Nyugat-Európában a vizet zárt rendszerekben továbbítják, így a veszély csekélyebb mértékű.

Az öngyilkosság a 10 és 24 évesek körében jelent problémát. Ebben a tekintetben is a közép-ázsiai országokban élő gyermekek vannak kitéve nagyobb veszélynek. A perspektívatlanság mellett az is szerepet játszik, hogy a gyermekek jobban hozzáférnek a mérgekhez.

Az orvosi ellátás számos életet megmenthetne. A volt Szovjetunió országaiban specializált egészségügyi központok hiányában kétszer annyi gyermek hal meg leukémiában, az alsó légúti megbetegedéseknél pedig a halálozási ráta húszszorososan haladja meg az európaiat. Ebben a tekintetben az oltások jelenthetnék a megoldást.