

***Morbidity and mortality in homeless individuals, prisoners, sex workers, and individuals with substance use disorders in high-income countries: a systematic review and meta-analysis***

The Lancet, 11. Nov. 2017 (online). doi: 10.1016/S0140-6736(17)31869-X.

**Kulcsszavak:** népegészségügy, morbiditás, mortalitás, halálozás, hajléktalanok, kábítószerfüggők, kirekesztett csoportok, nemzetközi

**Forrás Internet-helye:** [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(17\)31869-X/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31869-X/fulltext)

**Robert W. Aldridge és mt.** (Centre for Public Health Data Science, Institute of Health Informatics, University College London, London, UK; The Farr Institute of Health Informatics Research, University College London, London, UK) 337 tanulmány elemzéséből arra az eredményre jutottak, hogy a hajléktalanok, fogvatartottak, kábítószerfüggők és prostituáltak körében a halálozás kockázata tízszeresen meghaladja az általános lakosságét. A halálozás relatív kockázata a nők körében magasabb, mint a férfiakéban. A vizsgálat 38 országra terjedt ki.

### **A legfontosabb eredmények**

- A standardizált halálozási ráták 92 publikáció közül 91-ben szignifikánsan magasak voltak. A nőknél mért érték 11,86 (95%-os konfidencia-intervallum 10,42 – 13,30), férfiaknál 7,88 (95%-os konfidencia-intervallum 7,03 – 8,74).
- Az ICD-klasszifikáció szerinti legmagasabb halálozási ráták sérülésekkel, mérgezésekkel és egyéb külső hatásokkal összefüggésben adódtak (férfiak: 7,89, nők: 18,72).
- A megbetegedések prevalenciája minden vizsgált csoportnál a következő kategóriáknál volt a legmagasabb: hepatitis C (90%-ig), hepatitis B (65%), tuberkulózis (51%), légúti megbetegedések (asztmát beleértve 26%-ig), kardiovaszkuláris megbetegedések (koronáriás szívbetegséget beleértve 13%-ig).

A szegénység, a szociális kirekesztés, a kábítószerfüggés betegséget okoz. A kutatók ennek előfeltételezésével elemezték a morbiditást és mortalitást a hátrányos helyzetű lakossági csoportok körében. Jóllehet mind a hajléktalanok, mind a fogvatartottak és kábítószerfüggők körében a férfiak vannak többségben, a relatív kockázat mindhárom kategóriában a nők körében jóval magasabb. Az egyes tanulmányok összehasonlítása értelemszerűen viszonylag heterogén eredményekhez vezetett. A további összehasonlító vizsgálatok során azonban további következtetések vonhatók le arra vonatkozóan, hogy a különböző egészségügyi rendszerek, valamint az intézkedések intenzitása mennyiben kompenzálhatják a szegény és kirekesztett emberek ellátását.