

***Szélsőséges alkoholfogyasztás okozta halálozás
az Egyesült Államokban 2015 és 2019 között***

JAMA Netw Open. 2022;5(11):e2239485.

doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.39485 , November 1, 2022

Kulcsszavak: népegészségügy, szenvedélybetegségek, alkoholfogyasztás, alkoholizmus, halálozás, Egyesült Államok

Forrás Internet-helye:

<https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2798004>

Az Egyesült Államokban 2015 és 2019 között a 20 és 64 év közöttiek körében bekövetkezett minden nyolcadik haláleset az alkoholfogyasztás következményeinek tulajdonítható. Egy korábbi, ettől módszertanilag eltérő becslés szerint az alkoholfogyasztással összefüggő halálozás rátája 10% volt.

A lakossági keresztmetszeti vizsgálat az Egyesült Államok lakossága körében alkoholfogyasztással összefüggő halálesetek éves átlagértékének kiszámítására irányult a 2015 és 2019 közötti időszakban.

Az adatállományt a *Behavioral Risk Factor Surveillance System* 2.089.287 résztvevője által megadott a napi alkoholfogyasztás képezte, amelyet az egy főre eső országos kereskedelmi alkoholforgalom alapján felfelé korrigáltak. A halálozási adatok a *National Vital Statistics System*-ből származnak.

A felmérés időtartama alatt a vizsgált korcsoportban átlagosan 694.660 haláleset következett be. Kétharmada férfi volt. A becslés szerint évente 89.697 haláleset (12,9%) vezethető vissza szélsőséges alkoholfogyasztásra. A férfiak körében az arány 15,0%-ot, nőknél 9,4%-ot tett ki. A 20 és 49 év közöttiek korcsoportjában a halálesetek 20,3%-a tulajdonítható szélsőséges alkoholfogyasztásnak.

Az összlakosság körében a leggyakoribb halálokok: az alkoholos májbetegség, az „egyéb mérgezések” és a közúti balesetek. A 20 és 49 év közötti korosztály körében mindkét nemnél az „egyéb mérgezések” a leggyakoribbak.

Az alkohollal összefüggő halálozási ráta tekintetében az egyes szövetségi államok között jelentős különbségek mutatkoznak: Mississippi államban a legalacsonyabb (9,3%), Új-Mexikóban a legmagasabb (21,7%).

A vizsgálat eredményei szerint az Egyesült Államokban a 20 és 64 év közöttiek körében minden nyolcadik, a 20 és 49 évesek körében minden ötödik haláleset az alkoholfogyasztás következményeinek tulajdonítható. A szerzők javaslatai: az alkoholra kivetett adó emelése, az árusítóhelyek számának csökkentése, alkoholtesztek és gyors intervenciók.