

*A Parkinson-kóros öregúr esete a zöldszemű szörnnyel*  
World Journal of Clinical Cases, 2022; 10(3): 1024-1031

**Kulcsszavak:** esetleírás, lelki egészség, Parkinson-kór, Othello-szindróma, Kína

**Forrás Internet-helye:**

<https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v10/i3/1024.htm>

Egy 70 éves kínai férfit, akinél 60-ik életéve után jelentkeztek a Parkinson-kór tünetei, viselkedésváltozás miatt kórházba utaltak. Kereken hat hónapja féltékenykedni kezdett feleségére, ezzel egyidejűleg növekedett a libidója. Parkinson-kórja miatt kilenc éve Levodopa-Benszerazid-ot (200-50 mg/d), hat éve Pramipexol-t (naponta 0,75 mg és 1,5 mg között) és Szelegilin-t (1 mg/d) szedett. Az elmúlt években elsősorban rövidtávú emlékezete megromlott. Mielőtt kórházba került volna, három hónapig vizuális hallucinációi voltak. Fizikailag azonban rendben volt.

Az orvosok diagnózisa: Othello-szindrómával kísért Parkinson kór, impulzuskontroll-zavar és demencia.

A féltékenység különböző pszichotikus zavaroknál fordul elő. Organikus pszichózisoknál a rögeszmén kívül tájékozódási zavarok és egyéb kognitív szimptómák is jelentkeznek. Vizsgálatok szerint a féltékenységi rögeszme organikus (7%) és paranoid pszichózisoknál (6,7%), alkoholos pszichózisoknál (5,6%), valamint skizofrénia esetén (2,5%) a leggyakoribb, érzelmi zavaroknál viszont alig 0,1%. Egy kutatás szerint a féltékenységi rögeszme prevalenciája a demensek körében csaknem 16%. A szerzők szerint a Parkinson-kórban szenvedők körében az Othello-szindróma és az impulzuskontroll-zavarok a dopaminantagonisták mellékhatásainak tulajdoníthatók.

**Guo-Hua Zhao**, MD, Director, Doctor, Department of Neurology, The Fourth Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, No. N1 Shangcheng Avenue, Yiwu 322200, Zhejiang Province, China.  
[gzhao@zju.edu.cn](mailto:gzhao@zju.edu.cn)