

Kulcsszavak: szülészet-nőgyógyászat, császármetszés, Európa

Forrás Internet-helye:

[https://www.ejog.org/article/S0301-2115\(24\)00667-5/fulltext](https://www.ejog.org/article/S0301-2115(24)00667-5/fulltext)

Aktuális kapcsolódó: 29th European Congress of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG), 5-7 June 2025. Frankfurt am Main. Tanulmányok ismertetése:

<https://www.aerzteblatt.de/news/r-mls-kaiserschnitt-wer-ihn-will-und-warum-die-optimale-rate-keine-fixe-grosse-ist-a5bc46ab-e001-4a62-9ce1-0df7ae9acd54>

A felmérés 2000 január és 2023 június között megjelent cikkeket értékelt.

Adatforrások: *MEDLINE/PubMed, CINAHL, EMBASE, Global Index Medicus, Web of Science, Cochrane library.*

A császármetszések rátája Észak-Európában 20%, Dél-Európában 44%. Az eljárás alkalmazásának indokai rendszerint egy korábbi császármetszés vagy farfekvés.

Módszerek

- A vizsgálat keretében 44 tanulmányt értékelték a császármetszések rátája közötti különbségek összehasonlítása céljából Európa négy fő régiójában.
- Az elemzés a standardizáció során a császármetszések Robson-féle klasszifikációját alkalmazta.
- Az elsődleges végpontok: a császármetszések rátája régiók szerint, valamint az ezekhez a rátákhoz vezető okok.

Eredmények

- Császármetszések rátája régiók szerint:
 - Észak-Európa: 16,9%.
 - Nyugat-Európa: 28,6%.
 - Dél-Európa: 43,6%.
 - Közép-/Kelet-Európa: 23,6%.
- A császármetszés alkalmazásának fő indokai: (1) Multipara létező méhheggel és (2) Nullipara farfekvéssel.
 - Észak-Európa: 51,2%, ill. 88,8%.
 - Nyugat-Európa: 68,4%, ill. 92,3%.
 - Déle-Európa: 95,0%, ill. 90,0%.
 - Közép-/Kelet-Európa: 78,0%, ill. 92,5%.

Mehreen Zaigham (Department of Obstetrics & Gynaecology, Lund University and Skåne University Hospital, 205 01 Malmö, Sweden)
mehreen.zaigham@med.lu.se